

הערה גידול	כניסה מחדש (שעות)	תקופת המתנה	ריכוז חומר פעיל	חומר פעיל	קוד מנגנון	מינון ליישום	שם תכשיר	נגע
	12	4	60	SPINETORAM	5	0.04%	ספרטה סופר	עש פרי האשכול * גם עש קליפת ההדר
	4	7	120	SPINOSAD	5	0.06 - 0.04 %	טרייסר אולטרה	
	12	7	18	ABAMECTIN	6	0.075%	ורטיגו, ורטימק, אגרירון, אקטינמור, אקרימקטין, ביומקטין, ורמוט, ורקוטל	
	עם התיבשות	14	150	TEFLUBENZURON	15	0.07%	מוליט*	
הטיפול עם התחלת בקיעת הביצים.	14	14	240	METHOXYFENOZIDE	18	0.04%	ראנר	
התחלת הריסוס עם הטלת ביצי הדור הראשון או השני.	7	7	200	CHLORANTRANILIPROLE	28	0.02%	קורגן	
	12	7	200	FLUBENDIAMIDE	28	0.02%	טאקומי	
	עם התיבשות		8000 Units			0.50%	ביו טי*	
	עם התיבשות	0	16000 Units	BACILLUS THURINGIENSIS		0.30%	ביו טי פלוס*, תורסייד	
מועד הטיפול-לאחר חנטה, החל מבקיעת הזחלים.	עם התיבשות	3	32000 Units			0.10%	דלפין	
מרססים מהחנטה מדי 2-3 שבועות. יש לדאוג לכסוי מושלם של האשכולות.	עם התיבשות	3	0.54	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	11A	0.15%	דיפל *DF	
	4	14	300 +60	METHOXYFENOZIDE+ SPINETORAM	18+5	0.03%	ארמדה	
אין לרסס לפני 1 ביוני. אינו מיועד למשתלות.	24	20	480	CHLORPYRIFOS	1B	0.15%	דורסן, פירינקס, דור-און, דורפס	
	עם התיבשות	7	150	INDOXACARB	22A	0.03%	אוונט*	
	עם התיבשות	8	100 +50	CHLORANTRANILIPROLE+ LAMBDA CYHALOTHRIN	28+3A	0.02%	אמפליגו	
	12	14	100 +200	CHLORANTRANILIPROLE+ THIAMETHOXAM	28+4A	0.03%	דוריבו	
	12	7	100	BIFENTHRIN	3A	0.1 - 0.075 %	טלסטאר, אטלס, סטרטר, תלת סטאר, בי סקט	
לאחר הבציר ניתן לשלב עם 1% EOS להגברת ההדברה	12	7	80			0.12%	סיוז 80, תלתן	
	12	21	200	CYPERMETHRIN		0.05%	טיטאן, טאטא, סיטרון, סימשופר, סיפרין, תרסיפ 20	
	24	21	100			0.10%	סימבוש, סיפרין 10, שרפז	
אין לרסס יותר מ 2 ריסוסים בעונה	24	21	50	LAMBDA CYHALOTHRIN		0.15%	קרטה מקס	
	48	30	10 +100	DELTAMETHRIN+THIACLOPRID	3A+4A	0.10%	פרותיאוס	
	24	14	16 +30	ACETAMIPRID+BIFENTHRIN		0.25%	אצטאסטאר, אצטאפלוס	
עד גירה	14	14	12.5 +20	EMAMECTIN BENZOATE+ LUFENURON	6+15	0.10%	דורנים	
	עם התיבשות	14	100 +400			0.01%	דנים פיט	
	24	7	18 +45	ABAMECTIN+ CHLORANTRANILIPROLE	6+28	0.10%	ווליאם טרגו	
בשילוב שמן אולטראפיין 0.5%. אין להוסיף שמן לאחר שלב הפריחה	12	7	18	ABAMECTIN	6	0.075%	ורטיגו, ורטימק, אגרירון, אקרימקטין, ביומקטין, ורקוטל	אקרית הפקעים
פרוט הזנים ראה בתוית.	12	30	50	FENPYROXIMATE	21	0.10%	מטאור	
רסוס ראשון כשהשריגים באורך 20 ס"מ. רסוס שני 20 יום אחריו.	עם התיבשות	21	250	BROMOPROPYLATE	UN	0.20%	נירון 250	
	48	3	250	BUPROFEZIN	16	0.15%	אפלורד תר	כנימה קמחית של הגפן (פיקוס)
אין לרסס יותר מפעמיים בעונה, לא פחות מ 90 סמ"ק/ד.	עם התיבשות	7	100	SPIROTETRAMAT	23	0.09%	מובנטו 100	
השימוש אסור לפני ה- 15 ביוני. אין להשתמש במשתלות גפן.	48	20	479	CHLORPYRIFOS	1B	0.15 - 0.1 %	דורסן, פירינקס, דור-און, דורפס, קונפידור, סייפן, קודקוד, קוהינור, קונפידנס, אימקסי	
טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבול ע"י הגמעה בשלישי השני של ההשקיה	24	3	350	IMIDACLOPRID	4A	סמק/לגפן 2 - 1	קלאץ	
	12	30	50	CLOTHIANIDIN		0.05%	קלאץ	
		3	50	CLOTHIANIDIN		גרם/גפן 1	קלאץ	
	12	14	240	THIAMETHOXAM		סמק/לגפן 1.5 - 1	אקטרה	
	12	3	240	SULFOXAFLOL	4C	0.30%	פלאש	קימחית מנוקדת
	24	3	50	CHLORPYRIFOS	1B	גרם/גפן 40	דורסן אבקה 5 %	נמלים
	12	3	0.2	SPINOSAD	5	סמק/דונם 100	סקסס	זבוב פירות ים תיכוני
מועד אחרון-מתחילת פריחה ועד חנטה.	12	6	60	SPINETORAM	5	0.06%	ספרטה סופר	תרפיס פרחים קליפורני
	עם התיבשות		500	METHIOCARB	1A	0.10%	מסורול	
	עם התיבשות	8	75	ACRINATHRIN	3A	0.06%	רופאסט	
פרוט יישום התכשיר ראה בתוית.	48	3	25	DELTAMETHRIN		0.10%	דסיס	
	עם התיבשות	3	3.8+11+165	PYRETHRINS+ SOPHORA SP+ TEA TREE OIL		0.25%	טימור C	תרפיס אדום
פרוט יישום התכשיר ראה בתוית.		90	100		1B	קג/דונם 8 - 6	נמקור 10%	נמטודות חופשיות ועפצים
		90	400	FENAMIPHOS	1B	ליטר/דונם 2 - 1	נמקור 400	נמטודות חופשיות
	מידי		0.05	BACILLUS FIRMUS		קג/דונם 4	ביונם	נמטודות סלילניות
	עם התיבשות	14	150	TEFLUBENZURON	15	0.07%	שונית	פרופטה
יישום בודד במרסס המשקי, במהלך החודש שלפני הבלבול.	עם התיבשות	7	200	CHLORANTRANILIPROLE	28	0.02%	קורגן	
	48	3	250	BUPROFEZIN	16	0.10%	אפלורד תר	ציקדיים
	12	7	500	FLONICAMID	29	0.03%	טיפיקי	
	12	7	250			0.06%	דינמו	
	12	14	100 +200	CHLORANTRANILIPROLE+ THIAMETHOXAM	28+4A	0.03%	דוריבו	
	עם התיבשות	8	75	ACRINATHRIN		0.06%	רופאסט	
	12	7	100	BIFENTHRIN	3A	0.10%	טלסטאר, תלת-סטאר, סטרטר, סיוז, תלתן	
	12	10	50	ESFENVALERATE		0.10%	מוסטג	
	עם התיבשות	14	300	ETOFENPROX		0.10%	סנסור	
	24	7	240	TAU-FLUVALINATE		0.05%	מאבריק	

הערה גידול	כניסה מחדש (שעות)	תקופת המתנה	ריכוז חומר פעיל	חומר פעיל	קוד מנגנון	מינון ליישום	שם תכשיר	נגע
בשליש ה-2 של השקיה רגילה עם תחילת הבלבוב.	עם התיבשות	45	200	ACETAMIPRID	4A	0.02%	מוספילן, מוסקיטון	ציקדיים (המשך)
	12	14	200	DINOTEFURAN		גרם/דונם 50	איפון	
	עם התיבשות	3	350	IMIDACLOPRID		0.3 - 0.5 גפן/מק	קונפידור, סייפן, קוהינור, קודקוד, קונפידנס, אימקסי	
	עם התיבשות	30	480	THIACLOPRID		0.02%	קליפסו 480, קלימרה	
		30	250	THIACLOPRID		0.04%	תיאדור, ביסקייה	
	עם התיבשות	45	200	ACETAMIPRID		0.02%	מפיסטו	
	12	30	500	CLOTHIANIDIN		0.05%	קלאץ	
	12	14	240	THIAMETHOXAM		0.2 סמק/לגפן	אקטרה	
	48	30	10+100	THIACLOPRID+DELTAMETHRIN		0.10%	פרותיאוס	
	24	14	16+30	ACETAMIPRID+BIFENTHRIN		0.25%	אצטאסטאר, אצטאפלוס	
	12	14	150	TOLFENPYRAD	C1	0.10%	אומי	
השימוש אסור לפני ה- 15 ביוני. אין להשתמש במשתלות גפן.	12	6	60	SPINETORAM	5	0.06%	ספרטה סופר	תסיסנית (ז. התסיסה)
	4	7	120	SPINOSAD		0.08 - 0.06 %	טרייסר אולטרה*	
	24	22	50 g/kg	CHLORPYRIFOS	1B	2.5 דונם/קג	דורסן אבקה 5 %	
	48	20	479	CHLORPYRIFOS		0.15 - 0.1 %	דורסן, פירינקס, דור-און, דורפס,	
	12	7	100	BIFENTHRIN		0.10%	טלסטאר, תלת סטאר, אטלס, סטרטר, בי סקט	
	12	21	200	CYPERMETHRIN	3A	0.05%	טיטאן 20, סיפרין 20, סימשופר, טאטא, תרסיפ	
	24	21	100	CYPERMETHRIN		0.10%	סימבוש, סיפרין 10, שרפז	
	48	3	25	DELTAMETHRIN		0.10%	דסיס	
	12	10	50	ESFENVALERATE		0.10%	מוסטנג	
	עם התיבשות	21	50	LAMBDA CYHALOTHRIN		0.15%	קרטה 5*	
				טל"ח (טעות לעולם חוזרת)				