


הערה לגידול	כניסה מחדש (שעות)	המתנה לבציר (ימים)	חומר פעיל (גרם לליטר או לקג)	חומר פעיל	קוד מנגנון	מיבון ליישום	שם תכשיר	נגע
	24	3	17.4	BASIC COPPER CARBONATE	M01	0.40%	ג'מבו	נשותית
	48	7	770			0.30%	פונגורן, פרסול	
	48	7	655	COPPER HYDROXIDE		0.15%	קופרפורס	
	48	7	538			0.25%	קוצייד 2000	
	48	7	216	COPPER SULFATE PENTAHYDRATE		0.25%	מאסטרקופ	
1קג גפרת נחושת, 1 קג סיד בבוי 100 ליטר	48		980	COPPER SULPHATE		1.00%	גפרת נחושת	
	48	7	711	TRIBASIC COPPER SULFATE		0.25%	מרק בורדו אולטרא	
עם התיבשות	7	7	340			0.30%	נחושתן	
עם התיבשות	14	14	800	FOSETYL AL		0.20%	אליאט, גאוס	
24	3	3	204	MONO AND DIPOTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS		0.40%	ג'מבו	
עם התיבשות	3	3	600	MONOPOTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS ACID	0.20%	אגריפוס 600		
4	3	3	780	POTASSIUM PHOSPHITE	0.30%	קנון, קיפ, ניקון, קורדון		
עם התיבשות	3	3	500		0.30%	פוספירון		
עם התיבשות	14	14	500	FOSETYL AL+FOLPET	P07+M04	0.30%	גאוס אקסטרה	
48	7	7	580+350	POTASSIUM PHOSPHITE+COPPER OXYCHLORIDE	P07+M01	0.40%	הרקולס	
4	21	21	375+125	PHOSPHONIC ACID+DITHIANON	P07+M09	0.30%	פוטורה	
טיפול מניעה	4	15	250	AZOXYSTROBIN	C3	0.05%	עמיסטאר, זאוס, טופסטאר, מירדור, עמירן	
עם התיבשות	17	17	500	TRIFLOXYSTROBIN		0.02%	פלינט	
12	21	21	100	FENAMIDONE+MANCOZEB	C3+M03	0.10%	סכיור	
4	15	15	100+177	AZOXYSTROBIN+BOSCALID	C3+C2	0.10%	פרימיום	
2	13	13	128	PYRACLOSTROBIN+BOSCALID		0.05%	בליס	
עם התיבשות	6	6	67			0.08%	סיגנום	
עם התיבשות	7	7	100+177	TRIFLOXYSTROBIN+BOSCALID		0.10%	דיסקברי	
רק בשילוב תכשיר מקבוצה אחרת	12	14	500	DIMETHOMORPH	H5	0.05%	אתלט, אצן, דיימונד, ספינקס	
עם התיבשות	21	21	200	DIMETHOMORPH+FLUAZINAM	H5+C5	0.10%	באנג'ו פורטה	
בשילוב עם פוספירון	עם התיבשות	14	72+40	DIMETHOMORPH+PYRACLOSTROBIN	H5+C3	0.30%	קאבריו	
עם התיבשות	14	14	90+600	DIMETHOMORPH+MANCOZEB	H5+M03	0.3 - 0.2	אקרובט 69	
עם התיבשות	14	14	17.5	BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL+FOLPET	H5+M04	0.20%	וינקר	
עם התיבשות	14	14	17.5+700	BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL+MANCOZEB	H5+M03	0.20%	ולבון	
עם התיבשות	14	14	300	AMETOCTRADIN+DIMETHOMORPH	C8+H5	0.10%	אורבגו	
עד שני רסוסים לעונה.	48	21	25	MEFENOXAM+COPPER OXYCHLORIDE	A1+M01	0.40%	רידומיל גולד נחושת	
רק בשילוב תכשיר מקבוצה אחרת	12	21	480	MEFENOXAM	A1	0.03%	רודאו	
	12	21	40+640	MEFENOXAM+MANCOZEB	A1+M03	0.30%	רודאו MZ	
עם התיבשות	26	26	80+640	METALAXYL+MANCOZEB		0.25%	מנקולקסיל	
4	21	21	75			0.25%	מילור	
4	14	14	80+650	BENALAXYL+MANCOZEB		0.30%	גלבן מנקוזב	
24	60	60	750	MANCOZEB	M03	0.25%	מנקו די	
24	60	60	800			0.30%	מנקוזן	
מורשה עד ראשית הפריחה.	48	14	500	CAPTAN	M04	0.25%	מרפאן 50	
מורשה עד ראשית הפריחה.	48	14	800			0.15%	מרפאן 80	
עם התיבשות	3	3	238	TEA TREE OIL	BM01	0.50%	טימורקס גולד	
עם התיבשות	14	14	300	PYRIMETHANIL	D1	0.25%	מיתוס, אתוס	
עם התיבשות	14	14	400			0.20%	פירוס 400	
עם התיבשות	14	14	375+250	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	D1+E2	0.10%	סוויץ'	
עם התיבשות	7	7	500	FENHEXAMID	G3	0.15%	טלדור 500	
ימנע התפתחות בוטריטיס במהלך האיחסון.	24		500	FLUAZINAM	C5	0.10%	אוהיו, באנג'ו	
לגפן יין בלבד. עד 3 טיפולים לעונה	12	14	50	FENBUCONAZOLE	G1	0.15%	אינדר	
עם התיבשות	3	3	238	TEA TREE OIL	MB01	300 - 15	טימורקס גולד	
12	3	3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	
עם התיבשות	14	14	300	PYRIMETHANIL	D1	0.25%	מיתוס, אתוס	
עם התיבשות	14	14	400			0.20%	פירוס, פורטיס	
24	14	14	600	PYRIMETHANIL		0.13%	פרדיקט	
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה	24	14	375+250	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	D1+E2	0.10%	סוויץ', סוואנה	
עם התיבשות	13	13	252+128	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	C2+C3	0.10%	בליס	
עם התיבשות	6	6	267+67	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN		0.15%	סיגנום, סטנגה	
ימנע התפתחות רקבונות במהלך האיחסון.	24		500	FLUAZINAM	C5	0.15 - 0	אוהיו	
12	3	3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	
רסס עד 5 ימים מבציר או פעם בשבועיים מהבוהל.	עם התיבשות	3	560	METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA	BM	0.20%	נולי	
עם התיבשות	14	14	375+250	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	D1+E2	0.10%	סוויץ'	
עם התיבשות	6	6	267+67	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	C2+C3	0.10%	סיגנום	
ימנע התפתחות רקבונות במהלך האיחסון.	24		500	FLUAZINAM	C5	0.15 - 0	אוהיו	
רסס עד 5 ימים מבציר או פעם בשבועיים מהבוהל.	עם התיבשות	3	560	METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA	BM	0.20%	נולי	
12	3	3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	
	12	3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	

הערה לגידול	כניסה מחדש (שעות)	המתנה לבציר (ימים)	חומר פעיל (גרם לליטר או לק"ג)	חומר פעיל	קוד מנגנון	מיבון ליישום	שם תכשיר	נגע	
	עם התיבשות	45	250	DIFENOCONAZOLE	G1	0.02%	סקור, בוגירון, סקוטר, סקיפר	קימחון	
	12	14	50	FENBUCONAZOLE		0.04%	אינדר		
	24	14	240	MYCLOBUTANIL		0.02%	סיסטאן 24, ראלי		
	עם התיבשות	14	200	PENCONAZOLE		0.02%	אופיר, אורון, טופנקו, עומר		
	עם התיבשות	21	250	TEBUCONAZOLE		0.02%	פוליקור, טבוקול, טולדו, טיפקס, פולירון, אוריוס		
	12	7	100	TETRACONAZOLE		0.04%	דומארק		
	עם התיבשות	21	250	TRIADIMENOL		0.01%	באיפידן, שביט		
טיפול מניעה	4	15	250	AZOXYSTROBIN	C3	0.05%	עמיסטאר, זאוס, מירדור, עמיעוז, רוקסטאר		
		21	500	KRESOXIM METHYL		0.02%	סטרובי, קרוזו		
	עם התיבשות	17	500 gr\kg	TRIFLOXYSTROBIN		0.02%	פלינט, פאנטום		
	עם התיבשות	3	80+200	CYPROCONAZOLE+PICOXYSTROBIN	G1+C3	0.02%	אקנטו פלוס		
	12	60	125+200	DIFENOCONAZOLE+AZOXYSTROBIN		0.05%	אורטיבה טופ		
	עם התיבשות	10	200+120	TEBUCONAZOLE+AZOXYSTROBIN		0.03%	אזימוט		
	עם התיבשות	14	250+200			0.03%	דואט		
	עם התיבשות	7	250+125	TEBUCONAZOLE+TRIFLOXYSTROBIN		0.03%	אופק		
	עם התיבשות	7	250+500			0.02%	נתיבו 75		
ימי המתנה לענבי יין - 35.	עם התיבשות	14	500	SPIROXAMINE	G2	0.05%	אימפולס		
	24	7	200	PROQUINAZID	E1	0.02%	טליוס		
	4	21	250	QUINOXYFEN	E1	0.02%	אביר		
בריסוס על קימחון קיים יש לשלב עם קומולוס	עם התיבשות	21	500	METRAFENONE	B6	0.03%	ויוואנדו 500		
	עם התיבשות	21	300	PYRIFENONE		0.03%	קאסורי		
	4	44	200	PENTHIOPYRAD	C2	0.08%	שידו		
למניעת תנגודת יש לשלב שביט במיבון המלא.	עם התיבשות	18	50	CYFLUFENAMID	U06	0.01%	נץ		
	עם התיבשות	21	125	CYFLUFENAMID+DIFENOCONAZOLE	U06+G1	0.05%	סידלי טופ		
	24	21	400+10	SULFUR+TETRACONAZOLE	M02+G1	0.30%	דומארק קומבי		
	4	45	250+125	QUINOXYFEN+DIFENOCONAZOLE	E1+G1	0.02%	קווין		
	עם התיבשות	7	116+47	BUPIRIMATE+TEBUCONAZOLE	A2+G1	0.10%	וינטו		
	12	7	200+200	FLUOPYRAM+TEBUCONAZOLE	C2+G1	0.04%	לונה אקספריאנס 400		
	12	6	67+267	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	C2+C3	0.025%	סיגנום, סטנגה		
אין לטפל יותר מ 2 רסוסים ולא ברציפות	עם התיבשות	21	200+100	BOSCALID+KRESOXIM METHYL		0.05 - 0.03	קוליס 300		
	עם התיבשות	15	350	MEPTYLDINOCAP	C5	0.04%	קרטן סטאר		
אסור לשימוש בחממות ובבתי צמיחה	עם התיבשות	15	113+48	MEPTYLDINOCAP+MYCLOBUTANIL	C5+G1	0.1 - 0.08 %	שריף סופר		
	עם התיבשות	7	45+655	COPPER SULPHATE+POTASSIUM HYDROGEN CARBO	P01+P07	1.00%	מור		
בתוספת 100X טריטון 0.025%	מידי	3	100	POLYOXIN B	19	0.10%	פרלין		
בתוספת טריטון 100X- 0.025%	מידי	3	500			0.02%	פרלין סופר		
	עם התיבשות	3	500	POLYOXINS		0.02 - 0.0	פולאר		
ניתן לדסס עד ראשית הבשלה לא בזמן הפריחה	4	3	800	SULFUR	M02	0.7 - 0.5 %	גופרימור		
	24	3	825			0.40%	גופריתר		
	4		700			דונם 2 - 4	גפרביק 70		
	עם התיבשות		800			1.00%	גפרטיב 80		
	4		900			1.00%	גפרכל		
	עם התיבשות	3	700			0.7 - 0.4 %	הליוגופרית		
	24	3	800			0.50%	מיקרוטיול, סולי, סולפוזול, קואלה		
	24	3	800			0.40%	סוליסט		
	24	3	720			0.7 - 0.4 %	סולפרון		
	12	3	800			0.70%	סולפרון גרגרי		
	עם התיבשות	3	720			0.70%	סופה		
	עם התיבשות	3	800			0.4 - 0.2 %	קומולוס		
	12	3	13.4			BACILLUS SUBTILIS	BM	0.50%	סרנייד ASO
הגבלות חשובות ראו בתווית	עם התיבשות	3	972			DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT P	A	1.00%	שמן קייצי JMS
בתוספת משטח אגוז 0.4%	עם התיבשות	3	590	CANOLA OIL		0.80%	גניקן		
	עם התיבשות	3	660	TEA TREE OIL	MB01	1 - 0.5 %	טימורקס		
	עם התיבשות	3	238			0.50%	טימורקס גולד		
עד ראשית הפריחה.	48	14	500	CAPTAN	M04	0.25%	מרפאן 50		
עד ראשית הפריחה.	48	14	800			0.15%	מרקו, מרפאן 80		
לפני כל אירוע גשם. עד הפריחה.	48	14	700			0.15%	קפיטן		
	24	60	750	MANCOZEB	M03	0.30%	מנצידן, סנקוזב		
	24	60	750			0.35%	מנקו די		
	עם התיבשות	17	500	TRIFLOXYSTROBIN	C3	0.02%	פלינט		
	24		500	FLUAZINAM	C5	0.10%	אוהיו, באנג'ו		
	48	7	711	TRIBASIC COPPER SULFATE	M01	0.25%	מרק בורדו אולטרא		
				 (טעות לעולם חוזרת) טל"ח					

זרוע מתה