

נגע	שם תכשיר	מינון ליישום	קוד מנגנון	חומר פעיל	חומר פעיל (גרם לליטר או לקג)	המתנה לבציר (ימים)	כניסה מחדש (שעות)	הערה לגידול	
כשותית	ג'מבו	0.40%	M01	BASIC COPPER CARBONATE	17.4	3	24		
	פונגורן, פרסול	0.30%				770	7	48	
	קופרפורס	0.15%			COPPER HYDROXIDE	655	7	48	
	קוצייד 2000	0.25%				538	7	48	
	מאסטרקופ	0.25%			COPPER SULFATE PENTAHYDRATE	216	7	48	
	גפרת נחושת	1.00%			COPPER SULPHATE	980		48	1קג גפרת נחושת, 1 קג סיד כבוי ב100 ליטר
	מרק בורדו אולטרא	0.25%				711	7	48	
	נחושתן	0.30%		TRIBASIC COPPER SULFATE	340	7	עם התייבשות		
	אליאט, גאוס	0.20%		FOSETYL AL	800	14	עם התייבשות		
	ג'מבו	0.40%	P07	MONO AND DIPOTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS	204	3	24		
	אגריפוס 600	0.20%		MONOPOTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS ACID	600	3	עם התייבשות		
	קנון, קיפ, ניקון, קורדון	0.30%		POTASSIUM PHOSPHITE	780	3	4		
	פוספירון	0.30%			500	3	עם התייבשות		
	גאוס אקסטרה	0.30%	P07+M04	FOSETYL AL+FOLPET	500	14	עם התייבשות		
	הרקולס	0.40%	P07+M01	POTASSIUM PHOSPHITE+COPPER OXYCHLORIDE	580+350	7	48		
	פוטרה	0.30%	P07+M09	PHOSPHONIC ACID+DITHIANON	375+125	21	4		
	עמיסטאר, זאוס, טופסטאר, מירדור, עמירן	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN	250	15	4	טיפולי מניעה	
	פלינט	0.02%		TRIFLOXYSTROBIN	500	17	עם התייבשות		
	סכור	0.10%	C3+M03	FENAMIDONE+MANCOZEB	100	21	12		
	פרימיום	0.10%	C3+C2	AZOXYSTROBIN+BOSCALID	100+177	15	4		
	בליס	0.05%		PYRACLOSTROBIN+BOSCALID	128	13	2		
	סיגנום	0.08%			67	6	עם התייבשות		
	דיסקברי	0.10%			100+177	7	עם התייבשות		
	אתלט, אצן, דיימונד, ספינקס	0.05%	H5	DIMETHOMORPH	500	14	12	רק בשילוב תכשיר מקבוצה אחרת	
	באנג'ו פורטה	0.10%	H5+C5	DIMETHOMORPH+FLUAZINAM	200	21	עם התייבשות		
	קאבריו	0.30%	H5+C3	DIMETHOMORPH+PYRACLOSTROBIN	72+40	14	עם התייבשות	בשילוב עם פוספירון	
	אקרובט 69	0.3 - 0.2	H5+M03	DIMETHOMORPH+MANCOZEB	90+600	14	עם התייבשות		
וינקר	0.20%	H5+M04	BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL+FOLPET	17.5	14	עם התייבשות			
ולבון	0.20%	H5+M03	BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL+MANCOZ	17.5+700	14	עם התייבשות			

הערה לגידול	כניסה מחדש (שעות)	המתנה לבציר (ימים)	חומר פעיל (גרם לליטר או לקג)	חומר פעיל	קוד מנגנון	מינון ליישום	שם תכשיר	נגע
	עם התייבשות	14	300	AMETOCTRADIN+DIMETHOMORPH	C8+H5	0.10%	אורבגו	כשותית (המשך)
עד שני רסוסים לעונה.	48	21	25	MEFENOXAM+COPPER OXYCHLORIDE	A1+M01	0.40%	רידומיל גולד נחושת	
רק בשילוב תכשיר מקבוצה אחרת	12	21	480	MEFENOXAM	A1	0.03%	רודאו	
	12	21	40+640	MEFENOXAM+MANCOZEB		0.30%	רודאו MZ	
	עם התייבשות	26	80+640	METALAXYL+MANCOZEB	A1+M03	0.25%	מנקולקסיל	
	4	21	75			0.25%	מילור	
	4	14	80+650	BENALAXYL+MANCOZEB		0.30%	גלבן מנקוזב	
	24	60	750	MANCOZEB	M03	0.25%	מנקו די	
	24	60	800			0.30%	מנקוזן	
מורשה עד ראשית הפריחה.	48	14	500	CAPTAN	M04	0.25%	מרפאן 50	
מורשה עד ראשית הפריחה.	48	14	800			0.15%	מרפאן 80	
	עם התייבשות	3	238	TEA TREE OIL	BM01	0.50%	טימורקס גולד	
עד ראשית הפריחה.	48	14	500			0.25%	מרפאן 50	
עד ראשית הפריחה.	48	14	800	CAPTAN	M04	0.15%	מרקו, מרפאן 80	
לפני כל אירוע גשם. עד הפריחה.	48	14	700			0.15%	קפיטן	
	24	60	750			0.30%	מנצידן, סנקוזב	
	24	60	750	MANCOZEB	M03	0.35%	מנקו די	
	עם התייבשות	17	500	TRIFLOXYSTROBIN	C3	0.02%	פלינט	
	24		500	FLUAZINAM	C5	0.10%	אוהיו, באנג'ו	
	48	7	711	TRIBASIC COPPER SULFATE	M01	0.25%	מרק בורדו אולטרא	

הערה לגידול	כניסה מחדש (שעות)	המתנה לבציר (ימים)	חומר פעיל (גרם לליטר או לקג)	חומר פעיל	קוד מנגנון	מינון ליישום	שם תכשיר	נגע	
		עם התיבשות	14	300	PYRIMETHANIL	D1	0.25%	מיתוס, אתוס	בוטריטיס
		עם התיבשות	14	400			0.20%	פירוס 400	
		עם התיבשות	14	375+250	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	D1+E2	0.10%	סוויץ'	
		עם התיבשות	7	500	FENHEXAMID	G3	0.15%	טלדור 500	
	ימנע התפתחות בוטריטיס במהלך האיחסון.	24		500	FLUAZINAM	C5	0.10%	אוהיו, באנג'ו	
	לגפן יין בלבד. עד 3 טיפולים לעונה	12	14	50	FENBUCONAZOLE	G1	0.15%	אינדר	
		עם התיבשות	3	238	TEA TREE OIL	MB01	300 - 15	טימורקס גולד	
			3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	
		עם התיבשות	14	300	PYRIMETHANIL	D1	0.25%	מיתוס, אתוס	אספרגילוס
		עם התיבשות	14	400			0.20%	פירוס, פורטיס	
		24	14	600	PYRIMETHANIL		0.13%	פרדיקט	
	אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה	24	14	375+250	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	D1+E2	0.10%	סוויץ', סוואנה	
		עם התיבשות	13	252+128	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	C2+C3	0.10%	בליס	
		עם התיבשות	6	267+67	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN		0.15%	סיגנום, סטנגה	
	ימנע התפתחות רקבונות במהלך האיחסון.	24		500	FLUAZINAM	C5	0.15 - 0	אוהיו	
		12	3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	
	רסס עד 5 ימים מבציר או פעם בשבועיים מהבוהל.	עם התיבשות	3	560	METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA	BM	0.20%	נולי	
		עם התיבשות	14	375+250	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	D1+E2	0.10%	סוויץ'	ריזופוס
		עם התיבשות	6	267+67	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	C2+C3	0.10%	סיגנום	
	ימנע התפתחות רקבונות במהלך האיחסון.	24		500	FLUAZINAM	C5	0.15 - 0	אוהיו	
	רסס עד 5 ימים מבציר או פעם בשבועיים מהבוהל.	עם התיבשות	3	560	METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA	BM	0.20%	נולי	
			3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	
			3	13.4	BACILLUS SUBTILIS	BM	1.00%	סרנייד ASO	ריקבון חמוץ

נגע	שם תכשיר	מינון ליישום	קוד מנגנון	חומר פעיל	חומר פעיל (גרם לליטר או לקג)	המתנה לבציר (ימים)	כניסה מחדש (שעות)	הערה לגידול
קימחון	סקור, בוגרון, סקוטר, סקיפר אינדר	0.02%	G1	DIFENOCONAZOLE	250	45	עם התיבשות	
	סיסטאן 24, ראלי	0.04%		FENBUCONAZOLE	50	14	12	
	אופיר, אורון, טופנקו, עומר	0.02%		MYCLOBUTANIL	240	14	24	
	פוליקור, טבוקול, טולדו, טיפקס, פולירון, אוריוס	0.02%		PENCONAZOLE	200	14	עם התיבשות	
	דומארק	0.02%		TEBUCONAZOLE	250	21	עם התיבשות	
	באיפידן, שביט	0.04%		TETRACONAZOLE	100	7	12	
	עמיסטאר, זאוס, מירדור, עמיעוז, רוקסטאר	0.01%	TRIADIMENOL	250	21	עם התיבשות		
	סטרובי, קרוזו	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN	250	15	4	טיפול מניעה
	פלינט, פאנטום	0.02%		KRESOXIM METHYL	500	21		
	אקנטו פלוס	0.02%	G1+C3	TRIFLOXYSTROBIN	500 gr\kg	17	עם התיבשות	
	אוריטה טופ	0.02%		CYPROCONAZOLE+PICOXYSTROBIN	80+200	3	עם התיבשות	
	אזימוט	0.05%		DIFENOCONAZOLE+AZOXYSTROBIN	125+200	60	12	
	דואט	0.03%		TEBUCONAZOLE+AZOXYSTROBIN	200+120	10	עם התיבשות	
	אופק	0.03%		TEBUCONAZOLE+TRIFLOXYSTROBIN	250+200	14	עם התיבשות	
	נתיבו 75	0.03%		TEBUCONAZOLE+TRIFLOXYSTROBIN	250+125	7	עם התיבשות	
	אימפולס	0.02%	G2	TEBUCONAZOLE+TRIFLOXYSTROBIN	250+500	7	עם התיבשות	
	טליוס	0.05%		SPIROXAMINE	500	14	עם התיבשות	ימי המתנה לענבי יין- 35.
	אביר	0.02%	E1	PROQUINAZID	200	7	24	
	ויוואנדו 500	0.02%	E1	QUINOXYFEN	250	21	4	
	קאסורי	0.03%	B6	METRAFENONE	500	21	עם התיבשות	בריסוס על קימחון קיים יש לשלב עם קומולוס
	שידו	0.03%		PYRIOFENONE	300	21	עם התיבשות	
	נץ	0.08%	C2	PENTHIOPYRAD	200	44	4	
	סידלי טופ	0.01%	U06	CYFLUFENAMID	50	18	עם התיבשות	למניעת תנגודת יש לשלב שביט במינון המלא.
	דומארק קומבי	0.05%	U06+G1	CYFLUFENAMID+DIFENOCONAZOLE	125	21	עם התיבשות	
	קווין	0.30%	M02+G1	SULFUR+TETRACONAZOLE	400+10	21	24	
	וינטו	0.02%	E1+G1	QUINOXYFEN+DIFENOCONAZOLE	250+125	45	4	
לונה אקספריאנס 400	0.10%	A2+G1	BUPIRIMATE+TEBUCONAZOLE	116+47	7	עם התיבשות		
	0.04%	C2+G1	FLUOPYRAM+TEBUCONAZOLE	200+200	7	12		

הערה לגידול	כניסה מחדש (שעות)	המתנה לבציר (ימים)	חומר פעיל (גרם לליטר או לקג)	חומר פעיל	קוד מנגנון	מינון ליישום	שם תכשיר	נגע	
	12	6	67+267	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	C2+C3	0.025%	סיגנום, סטנגה	קימחון (המשך)	
אין לטפל יותר מ 2 רסוסים ולא ברציפות	עם התיבשות	21	200+100	BOSCALID+KRESOXIM METHYL		0.05 - 0.03			קוליס 300
	עם התיבשות	15	350	MEPTYLDINOCAP	C5	0.04%	קרטן סטאר		
אסור לשימוש בחממות ובבתי צמיחה	עם התיבשות	15	113+48	MEPTYLDINOCAP+MYCLOBUTANIL	C5+G1	0.1 - 0.08 %	שריף סופר		
	עם התיבשות	7	45+655	COPPER SULPHATE+POTASSIUM HYDROGEN CARBON	P01+P07	1.00%	מור		
בתוספת 100X טריטון 0.025%	מידי	3	100	POLYOXIN B	19	0.10%	פרלין		
בתוספת טריטון 100X- 0.025%	מידי	3	500			0.02%	פרלין סופר		
	עם התיבשות	3	500	POLYOXINS		0.02 - 0.0	פולאר		
ניתן לרסס עד ראשית הבשלה לא בזמן הפריחה	4	3	800	SULFUR	M02	0.7 - 0.5 %	גופרימור		
	24	3	825			0.40%	גופריתר		
	4		700			דונם 2 - 4	70		
	עם התיבשות		800			1.00%	גפרטיב 80		
	4		900			1.00%	גפרכל		
	עם התיבשות	3	700			0.7 - 0.4 %	הליוגופרית		
	24	3	800			0.50%	מיקרוטייל, סולי, סולפוזול, קואלה		
	24	3	800			0.40%	סוליסט		
	24	3	720			0.7 - 0.4 %	סולפרון		
	12	3	800			0.70%	סולפרון גרגרי		
	עם התיבשות	3	720			0.70%	סופה		
	עם התיבשות	3	800			0.4 - 0.2 %	קומולוס		
	12	3	13.4			BACILLUS SUBTILIS	BM	0.50%	סרנייד ASO
הגבלות חשובות ראו בתווית	עם התיבשות	3	972			DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT P	A	1.00%	שמן קייצי JMS
בתוספת משטח אגוז 0.4%	עם התיבשות	3	590	CANOLA OIL		0.80%	גניקן		
	עם התיבשות	3	660	TEA TREE OIL	MB01	1 - 0.5 %	טימורקס		
	עם התיבשות	3	238			0.50%	טימורקס גולד		
טל"ח (טעות לעולם חוזרת)									